



Jeziora, cz. 2 i 3

Genetyczne typy jezior:

a) Endogeniczne - powstałe na skutek procesów działających wewnątrz Ziemi:

- tektoniczne – występują w rowach tektonicznych lub synklinach czyli w zagłębieniach utworzonych przez ruchy skorupy ziemskiej, np. Bajkał (najgłębsze na świecie), Tanganika, Morze Martwe,
- wulkaniczne – powstają w wyniku procesów wulkanicznych, najczęściej w kraterach lub kalderach np. Jez. Toba, Owernii, Sewan.

b) egzogeniczne - powstałe na skutek procesów działających na powierzchni Ziemi:

- polodowcowe (powstają przez działalność lodowców górskich, lądolodów lub wód roztopowych):
 - morenowe - znajdują się w zagłębieniach moreny dennej, mają duże powierzchnie, urozmaiconą linię brzegową i są płytkie np. Śniardwy (największe jezioro w Polsce), Mamry, Niegocin,
 - rynnowe - w rynnach (zagłębieniach) powstałych dzięki wodom fluwiogłacjalnym (rzesznolodowcowym), są podłużne, głębokie, o stromych brzegach, np. Hańcza (najgłębsze jezioro Polski), Wigry, Gopło,
 - oczka wytopiskowe – przez wytopienie brył martwego lodu, małe i okrągłe np. Głęboć k. Tucholi,
 - karowe (cyrkowe) – powstają w miejscu pola firnowego lodowca górskiego, niewielkie, ale głębokie, np. Czarny Staw,
 - morenowe dolinne – w miejscu odcięcia doliny przez morenę np. Como, Garda.
- reliktowe – pozostałość po dawnych morzach, np. Morze Kaspiskie,
- krasowe – w zagłębieniach na obszarach procesów krasowych,
- deflacyjne (wydmowe) – między wydmami, płytkie np. jezioro Teke,
- przybrzeżne – przez odcięcie zatoki morskiej mierzeją lub lido, są duże, płytkie i słonawe np. Łebsko, Gardno, Jamno,
- zaporowe – przez zataśmowanie doliny rzecznej np. przez osuwisko np. Jez. Duszatyńskie,
- zakolowe – w wyniku odcięcia meandru (zakola) np. warciska i wiślicka, jezioro Czerniakowskie,
- deltowe – występują na obszarach delt rzecznych np. Druzno, Dąbie,
- meteorytowe – w zagłębieniu po uderzeniu meteorytu, okrągłe.

Miejsce na Twoją reklamę
info: reklama@lykwiedzy.pl